

The Evander logo features a red curved line above the word "EVANDER" in a large, bold, black sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the word.

INFORMACIÓN TÉCNICA
(Dibromuro de Diquat)

Herbicida agrícola

Evander® es un herbicida y desecante agrícola no selectivo que actúa por contacto sobre las partes verdes de las malezas.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Dibromuro de Diquat: 2Dibromuro de 9,10-dihidro-8a, 10a-diazoniafenantreno
Con un contenido de ion diquat de 53.55 %
(Equivalente a 200 g de ion Diquat/L a 25°C)

Formulación: Solución concentrada soluble

INDICACIONES DE USO AUTORIZADO

EVANDER® esta autorizado en México en los siguientes cultivos para control de las malezas que a continuación se indican.

CULTIVO	MALEZA	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Maíz *Maíz (SL) Dulce	Zacate cola de zorra (<i>Leptochloa filiformis</i>), Zacate de agua (<i>Echinochloa colona</i>), Flor blanca (<i>Parthenium hysterophorus</i>), Hierba peluda (<i>Acalypha ostryifolia</i> , <i>Acalypha habanensis</i>), Lechosa (<i>Euphorbia hirta</i>), Quebra platos (<i>Ipomoea purpurea</i>), Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Botón Blanco (<i>Spermacoce laevis</i>)	1.5-2.0	Aplique en post-emergencia dirigida a la maleza y al cultivo. Volumen de aplicación 450-550 L de Agua/ha. Adicionar un surfactante a razón de 0.3 mL/L de caldo de aspersión.
*Limonero *Naranja (SL) *Mandarino *Toronjo	Golondrina (<i>Euphorbia hirta</i>), Campanita (<i>Ipomoea indica</i>), Acahual amarillo (<i>Simsia amplexicaulis</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Zacate Gramma (<i>Cynodon dactylon</i>), Zacate Horqueta (<i>Paspalum notatum</i>)	1.5-2.0	Aplique en post-emergencia dirigida a la maleza. Volumen de aplicación 300-400 L de Agua/ha.
*Papa (3)	Desecante	2.0-3.0	Aplique al follaje cuando el cultivo haya alcanzado madurez fisiológica. Volumen de aplicación 530 L de agua/ha.

(): Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
SL= Sin Límite *Registro en trámite

CULTIVO	MALEZA	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
*Jitomate *Tomate de (SL) cáscara *Papa *Chile	Trébol (<i>Medicago polymorpha</i>), Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>), Quelite (<i>Amaranthus retroflexus</i>), Gigantón (<i>Tithonia tubaeformis</i>), Mostaza (<i>Brassicae campestris</i>)	1.5-2.0	Aplique entre surcos en post-emergencia a la maleza con una altura de 5 a 15 cm. Volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
*Calabacita *Calabaza *Pepino (SL) *Melón *Sandía	Gloria de la mañana (<i>Ipomoea purpurea</i>), Coquillo amarillo (<i>Cyperuses culentus</i>), Hierba amargosa (<i>Parthenium hysterophorus</i>), Zacate pata de gallo (<i>Eleusine indica</i>), Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>), Zacate pata de gallina (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	1.5-2.0	Aplique entre surcos en post-emergencia a la maleza con una altura de 5 a 15 cm. Volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
*Alfalfa (SL)	Cebadilla (<i>Chloris virgata</i>), Zacate horquieta (<i>Brachiaria plantaginea</i>), Pata de gallo (<i>Digitaria setigera</i>), Acahual (<i>Simsia amplexicaulis</i>), Rosilla (<i>Galinsoga parviflora</i>), Mala común (<i>Malva parviflora</i>)	2.0-3.0	Aplique en post-emergencia a la maleza después del corte y antes del rebrote. Volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.

(): Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
SL= Sin Límite *Registro en trámite

CULTIVO	MALEZA	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
*Sorgo (SL)	Zacate cola de zorra (<i>Leptochloa filiformis</i>), Zacate cadillo (<i>Cenchrus equinatus</i>), Tomatillo (<i>Physalis floridana</i>), Quesillo (<i>Anoda cristata</i>), Golondrina (<i>Euphorbia hirta</i>), Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	2.0	Aplice entre surcos en post-emergencia a la maleza en crecimiento activo. Volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
*Brócoli *Col *Col de (SL) *Bruselas *Coliflor	Zacate liendrilla (<i>Eragrostis pilosa</i>), Zacate sedoso (<i>Setaria parviflora</i>), Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>), Cerraja (<i>Sonchus oleraceus</i>), Gloria de la mañana (<i>Ipomoea purpurea</i>), Verdolaga (<i>portulaca oleracea</i>)	1.5-2.0	Aplice entre surcos en post-emergencia a la maleza con una Altura de 5 a 15 cm. Volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
*Algodón (SL)	Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>), Quesillo (<i>Anoda cristata</i>), Quelite (<i>Chenopodium album</i>), Cadillo (<i>Xanthium strumarium</i>), Alfalfilla (<i>Melilotus indicus</i>)	1.5-2.0	Aplice a la maleza con una altura de 5 a 15 cm. Volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
*Plátano (SL)	Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>), Acafilia (<i>Acalypha alopecuroides</i>), Zacate cabeza de burro (<i>Paspalum conjugatum</i>), Aceitilla (<i>Bidensodorata</i>), Malva (<i>Sida acuta</i>)	2.0	Aplice en post-emergencia a la maleza con una altura máxima de 20 a 30 cm. Volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
*Café (SL)	Tripa de pollo (<i>Commelina diffusa</i>), Acafilia (<i>Digitaria setigera</i>), Aceitilla (<i>Bidens pilosa</i>), Gloria de la mañana (<i>Ipomoea purpurea</i>), Pegajosa (<i>Galium mexicanum</i>)	2.0	Aplice en post-emergencia a la maleza con una altura máxima de 20 a 30 cm. Volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.

(): Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
SL= Sin Limite *Registro en trámite

CULTIVO	MALEZA	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
*Zarzamora *Arándano *Frambuesa *Grosella *Fresa (SL)	Zacate pitillo (<i>Ixophorus unisetus</i>), Zacate sedoso (<i>Setaria parviflora</i>), Lechugilla (<i>Sonchus olerceus</i>), Gusanillo (<i>Acalypha setosa</i>), Tripa de pollo (<i>commelina diffusa</i>), Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>)	2.0	Aplique entre hileras cuando la maleza tenga de 5 a 15 cm. Volumen de aplicación 400-500 L de agua/ha
*Caña de azúcar (SL)	Zacate grama (<i>Cynodon dactylon</i>), Aceitilla (<i>Bidens pilosa</i>), Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>), Coquillo (<i>Cyperuses culentus</i>), Rosilla (<i>Galingsoga parviflora</i>), Zacate cabeza de burro (<i>Paspalum conjugatum</i>)	2.0	Aplique en post-emergencia a la maleza y al cultivo con altura mayor a la maleza a controlar. Volumen de aplicación 400-500 L de agua/ha.
*Soya (SL)	Pasto de invierno (<i>Poa annum</i>), Coquillo (<i>Cyperus rotundus</i>), Chicolate (<i>Argemone mexicana</i>), Golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>), Verdolaga (<i>Portulaca olercea</i>), Zacate de agua (<i>Echinocloa colonum</i>)	1.5-2.0	Aplique entre hileras cuando la maleza tenga de 5 a 15 cm, evitando que la aspersion entre en contacto con el cultivo. Volumen de aplicación 400-500 L de agua/ha
*Aguacate (SL)	Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>), Tripa de pollo (<i>Commerlina diffusa</i>), Agritos (<i>Oxalis corniculata</i>), Quelite (<i>Amaranthus dubius</i>), Zacate guinea (<i>Panicum maximun</i>), Coquillo (<i>Cyperus rotundus</i>)	1.5-2.0	Aplique a la maleza con una altura de 20 a 30 cm, evitando que la aspersion entre en contacto con el cultivo. Volumen de aplicación 400-500 L de agua/ha

(): Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
SL= Sin Límite *Registro en trámite

RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO DE EVANDER®

Evander® es el sustituto oportuno.

**PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
PUEDE SER NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
PUEDE SER MORTAL SI SE INHALA**

PRECAUCIÓN

RSCO-HEDE-0220-X0131-375-31.41

HELM DE MÉXICO, S.A.